



Hablemos sobre la neumonía neumocócica.

Lleva esta guía a la próxima cita con tu médico o a tu visita a la farmacia. Estas son algunas preguntas para formular:

¿Estoy en riesgo debido a mi edad o afecciones de salud?

- ¿Cómo mi edad me pone en riesgo de contraer la neumonía neumocócica?
- ¿Cómo mis afecciones de salud me ponen en riesgo de contraer la neumonía neumocócica?
- ¿Cómo la neumonía neumocócica podría empeorar mi afección de salud?
- ¿Los medicamentos que tomo inhiben mi sistema inmunitario, poniéndome en riesgo de contraer la neumonía neumocócica? (Muéstrale a tu médico una lista de todos tus medicamentos.)

¿Prevnar 20® es adecuada para mí?

- ¿Puede Prevnar 20 ayudar a proveer protección adicional si ya me he vacunado con otra vacuna contra la neumonía?
- ¿Dónde puedo obtener Prevnar 20?

¿Tienes preguntas sobre la neumonía neumocócica para tu médico o farmacéutico? Escríbelas aquí:

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Prevnar 20 no debe administrarse a ninguna persona con un historial de reacción alérgica grave a cualquier componente de Prevnar 20 o al toxoide diftérico
- Las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta inmunitaria reducida. La información de seguridad no está disponible para estos grupos
- En personas de 18 años o más, los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el área de la inyección, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor en las coyunturas. Además, la hinchazón en el área de la inyección también fue común en personas de 18 a 59 años
- Pregúntale a tu proveedor de salud sobre los riesgos y beneficios de Prevnar 20. Solo un proveedor de salud puede decidir si Prevnar 20 es adecuada para ti

INDICACIONES PARA PREVNAR 20

Prevnar 20 es una vacuna aprobada para:

- la prevención de la enfermedad invasiva causada por *Streptococcus pneumoniae* serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F en personas de 6 semanas o más
- la prevención de la neumonía causada por *S. pneumoniae* serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F en personas de 18 años o más
- La indicación para prevenir la neumonía causada por *S. pneumoniae* serotipos 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F y 33F en personas de 18 años o más se aprueba basándose en las respuestas inmunitarias. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo

Los pacientes siempre deberían pedir consejo médico sobre eventos adversos a sus proveedores de atención médica. Se te aconseja reportar los efectos secundarios negativos de las vacunas a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Visita <https://vaers.hhs.gov/reporteventSpanish.html> o llama al 1-800-822-7967.

Consulte la información de prescripción completa [aquí](#).



Por favor, lee nuestra [Política de privacidad](#) y los [Términos de uso](#).

Fabricado por Wyeth Pharmaceuticals LLC.
Comercializado por Pfizer Inc.

PP-PNR-USA-1430 © 2023 Pfizer Inc.
Todos los derechos reservados. Octubre de 2023